



KEFAVET® VET

Filmomhulde tabletten Cefalexine monohydraat


Behandeling van infecties van de urinewegen
en terugkerende ernstige huidinfecties bij honden

Niets houdt mij tegen ! ...

Cefalexine

=

KEFAVET® VET



... ik zet mij ijverig door met ...



... een onvoorwaardelijke veiligheid



Dosering



KEFAVET® VET 250 mg

verkrijgbaar in Verpakking van 14 tabletten en
in verpakking van 70 tabletten

KEFAVET® VET 500 mg

verkrijgbaar in verpakking van 14 tabletten en
in verpakking van 70 tabletten

Infecties van de urinewegen (15 mg/kg)

Gewicht van de hond in kg	KEFAVET® VET	aantal tabletten		behandeling van 7 dagen	
		's morgens	's avonds	aantal tabletten	aantal tabletten
4	250 mg			3,5	7
8	250 mg			7	14
16	250 mg			14	28
25	250 mg			21	42
33	500 mg			14	28
50	500 mg			21	42

Huidinfecties * (30 mg/kg)

Gewicht van de hond in kg	KEFAVET® VET	aantal tabletten		behandeling van 7 dagen	
		's morgens	's avonds	aantal tabletten	aantal tabletten
4	250 mg			7	14
8	250 mg			14	28
12	250 mg			21	42
16	500 mg			14	28
25	500 mg			21	42
33	500 mg			28	56
41	500 mg			35	70
50	500 mg			42	84

* Dosering aanbevolen door : BCPI, 2007. Behandeling van oppervlakkige pyodermie bij de hond.
Folia Veterinaria 2007 n° 2, p. 3.

NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL: KEFAVET VET 250 mg of 500 mg filmomhulde tabletten INDICATIES VOOR GEBRUIK MET SPECIFICATIE VAN DE DOELDIERSOORT: Behandeling van urinewegsinfecties en terugkerende ernstige dermatologische infecties, veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor cefalexine. CONTRA-INDICATIES: Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor cefalosporines of penicilline of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken als resistentie tegen cefalosporines of penicillinen optreedt. Niet gebruiken bij konijnen, cavia's, hamsters en gerbils. BIJWERKINGEN (frequentie en ernst): Diarree of braken, meestal van milde aard, kan voorkomen. In geval van ernstige gastro-intestinale bijwerkingen, moet de behandeling worden gestopt. DOSERING EN TOEDIENINGSWEG: Voor orale toediening. Voor infecties van de urinewegen: 15 mg/kg lichaamsgewicht, tweemaal daags gedurende 14 dagen. Voor terugkerende ernstige dermatologische infecties: 25-30 mg/kg tweemaal daags gedurende minstens drie weken. Bij diepe pyodermie kan een behandelperiode van 4-6 weken vereist zijn. Het wordt aanbevolen om de baten/risicobeoordeling en de duur van de behandeling na een maand door de verantwoordelijke dierenarts te evalueren. Teneinde een juiste dosering te berekenen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden. Indien nodig kunnen de tabletten worden fijngestampt of aan het voer worden toegevoegd. Kefavet250/500-kortSKP-110511.