

ANIMAL
HEALTH



ATIPAZOLE 5 mg/ml

Atipamezole hydrochloride 5 mg/ml
oplossing voor injectie voor honden en katten

Zacht en sereen ontwaken



www.prodivet.com

Atipamezole hydrochloride 5 mg/ml

- ✓ antagoniseren van medetomidine en dexmedetomidine
- ✓ snelle opname: ontwaken na 5 tot 10 minuten
- ✓ eenvoudige en nauwkeurige dosering



Medetomidine 1,0 mg/ml	Atipamezole hydrochloride 5,0 mg/ml
0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 40 µg/kg lichaamsgewicht	0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht
Dexmedetomidine 0,5 mg/ml	Atipamezole hydrochloride 5,0 mg/ml
0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 20 µg/kg lichaamsgewicht	0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht
Dexmedetomidine 0,1 mg/ml	Atipamezole hydrochloride 5,0 mg/ml
0,2 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 20 µg/kg lichaamsgewicht	0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht



Medetomidine 1,0 mg/ml	Atipamezole hydrochloride 5,0 mg/ml
0,08 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 80 µg/kg lichaamsgewicht	0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht
Dexmedetomidine 0,5 mg/ml	Atipamezole hydrochloride 5,0 mg/ml
0,08 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 40 µg/kg lichaamsgewicht	0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht
Dexmedetomidine 0,1 mg/ml	Atipamezole hydrochloride 5,0 mg/ml
0,4 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 40 µg/kg lichaamsgewicht	0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht

NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL: ATIPAZOLE 5 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden en katten. INDICATIES VOOR GEBRUIK MET SPECIFICATIE VAN DE DOELDIERSOORTEN: Atipamezolehydrochloride is een selectieve α_2 -antagonist, geïndiceerd voor het ongedaan maken van het sedatief effect van medetomidine en dexmedetomidine bij honden en katten. CONTRA-INDICATIES: Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor een van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij fokdieren. Niet gebruiken bij dieren die lijden aan lever- nier- of hartaandoeningen. BIJWERKINGEN (frequentie en ernst): Een voorbijgaand bloeddrukverlagend effect is waargenomen tijdens de eerste 10 minuten na injectie van atipamezolehydrochloride. Zeldzame gevallen van hyperactiviteit, tachycardie, speekselvloed, atypische vocalisatie, spiertremoren, braken, verhoogde ademhalingsfrequentie, ongecontroleerd urineverlies en ongecontroleerde defecatie werden waargenomen. In zeer zeldzame gevallen kan er opnieuw sedatie optreden of wordt de hersteltijd niet korter na toediening van atipamezole. Bij katten, wanneer lage doses atipamezole worden gebruikt om gedeeltelijk de effecten van medetomidine of dexmedetomidine ongedaan te maken, moeten alle nodige voorzorgen worden genomen om onderkoeling te voorkomen, zelfs na het ontwaken van het dier. DOSERING EN TOEDIENINGSWEG: Voor eenmalige intramusculaire toediening. De dosis is afhankelijk van de eerder toegediende dosis van medetomidine of dexmedetomidine. Atipamezolehydrochloride wordt 15 tot 60 min na injectie met medetomidine- of dexmedetomidinehydrochloride toegediend. Bij honden: De atipamezolehydrochloride dosis (in µg per kg lichaamsgewicht) bedraagt het vijfvoudige van de eerder toegediende medetomidinehydrochloride dosis of het tienvoudige van de dexmedetomidinehydrochloride dosis. Aangezien de concentratie van het werkzaam bestanddeel (atipamezolehydrochloride) vijfmaal hoger is in dit product in vergelijking met de concentratie van preparaten die 1 mg medetomidinehydrochloride per ml bevatten en tienmaal hoger is in vergelijking met de concentratie van preparaten die 0,5 mg dexmedetomidinehydrochloride bevatten, is een gelijk volume van beide preparaten vereist. Aangezien de 50-voudige concentratie vergeleken met preparaten die 0,1 mg dexmedetomidine hydrochloride bevatten, wordt een volume van het atipamezol preparaat vereist dat 5 keer lager is. Doseringvoorbeeld voor honden: Dosering van Medetomidine 1,0 mg/ml oplossing voor injectie: 0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 40 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van atipamezolehydrochloride 5,0 mg/ml oplossing voor injectie: 0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van Dexmedetomidine 0,5 mg/ml oplossing voor injectie: 0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 20 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van atipamezolehydrochloride 5,0 mg/ml oplossing voor injectie: 0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van Dexmedetomidine 0,1 mg/ml oplossing voor injectie: 0,2 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 20 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van atipamezolehydrochloride 5,0 mg/ml oplossing voor injectie: 0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht. Bij katten: De atipamezolehydrochloride dosis (in µg per kilogram lichaamsgewicht) is tweemaal hoger is in vergelijking met de concentratie van preparaten die 1 mg medetomidinehydrochloride per ml bevatten en tienmaal hoger is in vergelijking met de concentratie van preparaten die 0,5 mg dexmedetomidinehydrochloride bevatten, dient de helft van het volume van het product ten opzichte van de eerder toegediende medetomidine of dexmedetomidine te worden gegeven. Aangezien de 50-voudige concentratie vergeleken met preparaten die 0,1 mg dexmedetomidine hydrochloride bevatten, wordt een volume van het atipamezol preparaat vereist dat 10 keer lager is. Doseringvoorbeeld katten: Dosering van Medetomidine 1 mg/ml oplossing voor injectie: 0,08 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 80 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van atipamezolehydrochloride 5,0 mg/ml oplossing voor injectie: 0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van Dexmedetomidine 0,5 mg/ml oplossing voor injectie: 0,08 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 40 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van atipamezolehydrochloride 5,0 mg/ml oplossing voor injectie: 0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van Dexmedetomidine 0,1 mg/ml oplossing voor injectie: 0,4 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 40 µg/kg lichaamsgewicht. Dosering van atipamezolehydrochloride 5,0 mg/ml oplossing voor injectie: 0,04 ml/kg lichaamsgewicht (LG) overeenkomend met 200 µg/kg lichaamsgewicht. De hersteltijd bij honden en katten wordt verkort tot ongeveer 5 minuten. Het dier wordt mobiel ongeveer 10 minuten na toediening van het product. Atipazole-kortSKP-281013.